

22. Nowe stanowiska i uwagi o polskich *Curculionoidea* (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae)

New records and notes on Polish *Curculionoidea* (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae)

Nanophyes sahlbergi (SAHLBERG, 1834)

- Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Ruda Milicka, 17-27 VII 1991, 250 exx., na światło lampy rtęciowej w parny i ciepły wieczór (leg. L. BOROWIEC).

Podawany już z tego stanowiska na podstawie jednego okazu. Na uwagę zasługuje liczba i sposób odłowienia tego chrząszcza.

Otiorhynchus inflatus var. *salebrosus* BOHEMAN, 1843

- Dolny Śląsk, Siechnice k. Wrocławia, 9 II 1989, 1 ex. martwy wysiany ze ściółki pod starej wierzby - *Salix* sp.; Zakrzów-Kotowice k. Wrocławia, 8 VI 1991, 6 exx. zebranych w nocy na malinach - *Rubus* sp. w grądzie (leg. J. KANIA).

Znany z Sudetów, Karpat i kilku stanowisk w dorzeczu Wisły. Podawany również przed wieloma laty ze Śląska.

Otiorhynchus apfelbecki STIERLIN, 1887

- Roztocze, rez. Czerkies, 15 VI 1990, 1 ex. zebrany w czerpaki z gałęzi dębu - *Quercus* sp. (leg. L. BOROWIEC).

Znany do tej pory z okolic Przemyśla. Nowy dla Roztocza.

Otiorhynchus smreczynski CMOLUCH, 1968

- Wyżyna Małopolska, rez. Skowronno, 29 IV 1990, 2 exx., 1 V 1990, 6 exx. wysianych ze ściółki na kserotermicznym zboczu; Pińczów, 12-13 V 1991, kilkadziesiąt egzemplarzy zebranych w czerpak z żywopłotu na ligustrze - *Ligustrum vulgare* L. (leg. J. KANIA, J. SZYPUŁA, M. WANAT).

Podawany do tej pory Lublina i Hajnówki. Nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

Sitona gressorius (FABRICIUS, 1792)

- Pobrzeże Bałtyku, Wolin, Międzyzdroje - Dziwnów, 11 IV 1991, 1 ex. na wydmie (leg. J. R. POMORSKI).
- Dolny Śląsk, Wrocław-Wojnow, 13 X 1991, 1 ex. (leg. J. KANIA).

Podawany do tej pory z kilku stanowisk w Wielkopolsce i z Sudetów Wschodnich. Nowy dla Pobrzeża Bałtyku i Dolnego Śląska.

Sitona regensteinesis (HERBST, 1794)

- Pojezierze Pomorskie, Szczecin, 18 VIII 1949, 2 exx. w kolekcji M. KŁAPACZA (IZ PAN Warszawa).

Wykazany ostatnio z Puszczy Zielonka k. Poznania. Dawne doniesienia o występowaniu tego gatunku w Polsce nie zostały poparte okazami dowodowymi. Drugie pewne stanowisko w kraju. Nowy dla Pojezierza Pomorskiego.

Liparus coronatus (GOEZE, 1777)

- Wyżyna Małopolska, rez. Skowronno, 29 IV 1990, 1 ex. pod kamieniem na kserotermicznym zboczu (leg. J. KANIA).

Bardzo rzadki gatunek, w Polsce łowiony pojedynczo. Znany do tej pory z okolic Chełma Lubelskiego, Przemyśla, Krakowa, Miechowa i ze Śląska.

Ceutorhynchus sulcatus CH. BRISOUT, 1869

- Dolny Śląsk, Wrocław – Książę Małe, 8 VI 1991, 1 ex. zebrany w czerpak na ugorze przy wysypisku śmieci (leg J. KANIA).

Podawany z kilku stanowisk w południowej części Polski. Nowy dla Dolnego Śląska.

Ceutorhynchus borraginis (FABRICIUS, 1792)

- Wyżyna Małopolska, Pińczów, 12 V 1991, 3 exx. zebrane z *Cynoglossum officinale* L. (leg. J. KANIA i J. SZYPUŁA).

W Polsce podany z kilku rozproszonych stanowisk. Nowy dla Wyżyny Małopolskiej.

JAROSŁAW KANIA, Wrocław

23. Nowe stanowiska *Noctua interjecta* (HÜBNER, 1803) w Polsce (*Lepidoptera*, *Noctuidae*)

New records of *Noctua interjecta* (HÜBNER, 1803) in Poland (*Lepidoptera*, *Noctuidae*)

Noctua interjecta (HBN.) jest gatunkiem europejskim, występującym w Europie zachodniej i południowej. Północna granica zasięgu tego gatunku przebiega przez Irlandię, północną Anglię i dalej w kierunku wschodnim przez północne Niemcy aż do ich wschodniej części, skąd następuje znaczne przesunięcie areалу występowania na południe, aż do zachodniej Austrii. Dalej w kierunku wschodnim granica ta przebiega przez Czechosłowację, Węgry do wschodniej Rumunii, gdzie znajdują się najdalej na wschód wysunięte stanowiska występowania tego gatunku. Południowa granica zasięgu biegnie od Hiszpanii wybrzeżem Morza Śródziemnego po Bałkany.

Z Polski *N. interjecta* wykazywano dotychczas jedynie z Pogórza Cieszyńskiego i z Olszan koło Krasiczyna. Informacje te dotyczą przypadkowych stwierdzeń pojedynczych okazów na bardzo odległych stanowiskach od zwartego zasięgu występowania tego gatunku i wymagają potwierdzenia.

W latach 1990–91 gatunek ten wykazano po raz pierwszy z północno-zachodniej Polski jednocześnie na kilku stanowiskach:

- Szczecin, teren Puszczy Wkrzańskiej 7 VIII 1990, 2 exx. T. SMOLAK leg.
- Świnoujście, na Uznamie 13 VIII 1990, 1 ex., 7–15 VIII 1991, 5 exx. J. NOWACKI leg.
- Międzywodzie 9 VIII 1991, 2 exx. J. NOWACKI leg.
- Mrzeżyno 5 VIII 1991, 1 ex. J. NOWACKI leg.

Ilość stanowisk oraz stwierdzonych na nich osobników omawianego gatunku, wskazują jednoznacznie na rozszerzenie się areалу występowania *N. interjecta* w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

JANUSZ NOWACKI, Poznań