

Nowe dla Polski gatunki i odmiany chrząszczy.

(Coléoptères nouveaux pour la Pologne).

Podał

SZYMON TENENBAUM.

[*Haliphus transvolgensis* Sem. Okolice Warszawy; Wierzbno 27. V. 93 — jeden okaz ze zbioru L. Hildta (R. Scholz i A. Zimmermann det.). Okaz znajduje się w zbiorze Scholza w Lignicy. Do fauny krajowej, aż do znalezienia nowych okazów, nie włączam go, zbyt bowiem małe jest prawdopodobieństwo występowania tego gatunku u nas; możliwe, że Hildt obcemu owadowi dał kartkę: Wierzbno].

Agabus undulatus a. pictus Meier. Jeden okaz znalazłem w Chylicach pod Warszawą.

Rhantus suturellus v. ♀ subopacus Mannh. Białowieża 14. V. 21.

Anthobium minutum v. puncticolle Gredl. Samoistna odmiana a nie synonim formy typowej. Białowieża-Gródek 22. VII. 21.

Stenus obscuripes Ganglb. Czarnohora, Howerla. Jeden okaz otrzymałem w darze od dyr. J. Roubala.

Atheta georgiana Motsch. Samoistny gatunek, a nie synonim *A. oblonga* Er. Okolice Warszawy: Wawer 26. IX. 20. — jeden samiec.

Ochthebius impressus v. lutescens Kuw. Województwo Warszawskie: Urle 12. VIII. 10.

Podabrus alpinus v. lateralis Er. Pieniny: dolina potoku Pienińskiego 28. V. 12.

Cantharis quadripunctata v. sulcicornis Reitt. Pieniny: Sromowce Niżne; okolice Piwnicznej: dolina Czerce, dolina potoku Grobki. V. 12.

C. rustica a. mimothorax Pic. Okolice Warszawy: Dąbrówka 26. V. 23.

C. nigricans a. luteipes Schilsky. Puszcza Niepołomska 14. VI. 14. Dla gub. Kijowskiej podał go Fejfer.

C. longicollis Kiesw. ♂ i ♀ in copula w Truskawcu 24. VI. 22.

Rhagonycha rorida Kiesw. Truskawiec koło Borysławia 24. VI. 22, Tenczynek koło Krakowa 15. VI. 12 — po jednym okazie.

Dasytes plumbeus a. coeruleascens Schilsky. Kilkanaście okazów w Młocinach pod Warszawą 28. V. 18.

Propylaea 14-punctata a. lyra Walter. Okolice Warszawy: Marymont 6. VIII. 17 — jeden okaz.

Athous haemorrhoidalis a. faeculentus Buys s. Okolice Warszawy, okolice Krakowa, Pomorze.

A. vittatus a. stephensi Buys s. Mam go z Wilna; miejsce znalezienia nie jest ściślej określone.

Adrastus limbatus a. turcicus Stierl. Truskawiec 24. VI. 22 — kilka okazów.

Anthicus flavipes a. flavescens Pic. Występuje wraz z formą typową.

Hypophloeus longulus Gyll. Okolice Warszawy: Dembe Wielkie 18. IV. 16 — siedem okazów pod korą pnia sosnowego.

Crioceris asparagi a. cruciata Schuster. Wilno, bez dokładniejszych danych.

Chrysomela chalcites Germ. Notowany z Rosji połudn., Istrii, Dalmacji; nie występuje w Niemczech. Pięć okazów znalazłem w dolinie potoku Pienińskiego 28. V. 12.

Ch. aurichalcea Mannh. Formę typową notują z wschodniej Rosji. Dwa okazy znalazłem w Kaczym Dole pod Warszawą 9. VII. 16.

Ch. carpathica v. hopffgarteni W se. Między Piwniczną a Pieninami: dolina Czercze 23. V. 12 — jeden okaz.

Phytodecta linneana a. kraatzi Westh. Ojców 25. VI. 09 — jeden okaz.

Longitarsus luridus f. alata: Zamojszczyzna, okolice Warszawy.

L. ganglbaueri Heik. (*piciceps* auct. part.). Rozpowszechniony w całej niemal Europie, na Kaukazie, na Syberji; Władywostok, ? Japonia. — Okolice Warszawy: Saska Kępa 26. IV. 16. (Heikertinger det.).

L. waterhousei Kutsch. (*menthae* Bedel). Rozpowszechniony w Niemczech, Austrii, Francji, Anglii, Kroacji, ? Azji Mniejszej. Ordynacja Zamojskich: Obroc koło Zwierzyńca 22. VIII. 12 (Heikertinger det.).

L. symphyti Heik. (*aeruginosus* Weise non Foudr.). Rozpowszechniony w Niemczech, Austrii, Francji. Znalazłem go w Warszawie, w Łazienkach 25. VIII. 15.

Tychius jemoralis Bris. Gródek koło Białowieży 22. VII. 21.

T. sorex Gyll. Piaseczno pod Warszawą 13. VI. 14.

Sibinia signata a. variata Gyll. Okolice Warszawy: Pyry 15. IX. 20.

Gymnetron squamicolle Reitt. Białowieża 3. VII. 20 — jeden okaz.

Ceutorrhynchus pallidicornis Bris. Truskawiec 24. VI. 22 — jeden okaz (H. Scheuch det.).

C. leprieuri Bris. Ordynacja Zamojskich: Smoryń 29. VII. 10 — kilka okazów (det. H. Scheuch w Wiedniu).

Homorosoma validirostris Gyll. Występuje w połudn. Rosji i na Węgrzech, u nas zgoła niespodziewanie. Saska Kępa koło Warszawy 5. IV. 08. Okaz w zbiorze H. Scheucha w Wiedniu.

Apion cerdo a. consanguineum Bach. Kilkanaście okazów w Białowieży 25. IV. i 24. V. 21.

A. elongatum Desbr. Okolice Warszawy: Wawer IX. 20 i Drewnica.

A. detritum catenulatum Wagner. Okolice Warszawy: Skolimów 24. IX. 20. (Wagner det.).

Aphodius mixtus a. unicolor Schilsky. Tatry (zbiory Kom. Fizjogr. Akad. Umiejętn.).

Z biologji kornika *Phloeosinus thujae* Perris.

(Biologisches über den Borkenkäfer *Phloeosinus thujae* Perris).

Z 3-ma figurami. (Mit 3 Textfiguren).

Napisali

A. KOZIKOWSKI i M. NUNBERG.

Wielu autorów podaje Europę połudn. jako jego ojczyznę, lecz stanowiska jego na Śląsku, w Poznańskim, a nawet na Pomorzu wskazują na bardziej ku półn. rozszerzony zasiąg. Dla Małopolski został znaleziony 14. IX. r. b. w okolicy Jordanowa na Przykcu (Nunberg), oraz 10. X. b. r. (Prof. Kozikowski) na terytorjum gminy Wiszenka, na półn. od rewiru Wiszenka, przy krzyżu i kocie 382 (mapa geol.), gdzie jałowiec porasta bardzo gęsto kilkadziesiąt ha, tworząc charakterystyczne juniperetum. 23. X. b. r. (Prof. Kozikowski) zostało odnalezione stanowisko o 10 km. na wschód od poprzedniego, na t. zw. „Niedźwiedziej Górze“, kota