

KRÓTKIE DONIESIENIA**SHORT COMMUNICATIONS****603. Pierwsze stanowisko *Aradus brevicollis* FALLÉN, 1807 oraz drugie *Aneurus avenius* (DUFOUR, 1833) (Heteroptera: Aradidae) w Beskidach Wschodnich**

First record of *Aradus brevicollis* FALLÉN, 1807 and second of *Aneurus avenius* (DUFOUR, 1833) (Heteroptera: Aradidae) in the Eastern Beskidy Mts.

KEY WORDS: Heteroptera, Aradidae, true-bugs, new record, Eastern Beskidy Mts., Poland.

Aradus brevicollis FALLÉN, 1807 i *Aneurus avenius* (DUFOUR, 1833) są jednymi z rzadziej spotykanych przedstawicieli korowcowatych w Polsce. *Aradus brevicollis* został wykazany po raz pierwszy w Polsce przed zaledwie 20 laty (LIS J. A. 1990: Pol. Pis. Ent., **59**: 511-525) i do tej pory stwierdzono go na nie więcej niż 5 stanowiskach w 5 krainach – Puszczy Białowieskiej, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Sudetach, Podlasiu i Górnym Śląsku (LIS J. A. 1990: *ibid.*; KUBISZ 1992: Wiad. entomol., **11**, 1: 7-11; SKÓRKA 1994: Acta ent. Siles., **2**, 1: 13-20). Jest gatunkiem o rozmieszczeniu transpalearktycznym i o słabo udokumentowanej biologii. Najczęściej znajduje się pod korą drzew iglastych w dużych kompleksach leśnych (LIS J. A. 2001: Klucze oznacz. Owad. Pol., XVIII, **11**: 1-33).

Aneurus avenius jest znany z 10 stanowisk, w siedmiu krainach – Pobrzeżu Bałtyku, Puszczy Białowieskiej, Roztoczu, Bieszczadach, Beskidzie Wschodnim, Beskidzie Zachodnim i Górnym Śląsku (LIS J. A. 1990: *ibid.*; KUBISZ 1992: *ibid.*; LIS J. A., LIS B. 1998: Ann. Upper Siles. Mus., Bytom, Ent. **8/9**: 107-146). Większość tych stwierdzeń pochodzi sprzed ponad 50 lat. Gatunek ten ma rozmieszczenie palearktyczne, nie omija także gór. Odławiany był za korą różnych gatunków drzew liściastych, znajdowano go także w gnijącym drewnie (LIS J. A. 2001: *ibid.*), oraz sporadycznie w szyszkach (WACHMANN i in. 2007: Die Tierwelt Deutschlands. 78, Wanzen 3. Goecker, Evers, Keltern. 272 ss.).

Poniżej przedstawiamy nowe stanowiska tych gatunków w Beskidach Wschodnich. Dla *Aradus brevicollis* jest to pierwsze stanowisko w tej krainie, a dla *Aneurus avenius* drugie. Ten drugi podawany był wcześniej z Beskidu Wschodniego z Barwinka (KUBISZ 1992: *ibid.*).

***Aradus brevicollis* FALLÉN, 1807**

– Beskid Wschodni: Pogórze Przemyskie (UTM: FV08), 10 IX 2011 – 1 ex., las łęgowy, pod kamieniem w potoku, leg. et det. M. A. MAZUR. ver. et coll. G. HEBDA.

***Aneurus avenius* (DUFOUR, 1833)**

– Beskid Wschodni: Pogórze Przemyskie (FV08), 10 IX 2011 – 1 ex., las łęgowy, pod korą martwego graba, leg. et det. M. A. MAZUR. ver. et coll. G. HEBDA.

Sz szczególnie interesujące jest stwierdzenie *Aradus brevicollis* pod kamieniem w korycie potoku. Może to wskazywać na nowe, niepodawane wcześniej mikrośrodowisko wykorzystywane przez ten gatunek.