

Ze znalezieniem pod Wilnem *A. imperator* L., przesuwa się znacznie na północ granica zasięgu tego mediteranejskiego gatunku.

### SUMMARY.

Authoress reports the catching of a nymph of *Anax imperator* L. in Krzyżackie Jezioro (Zielone Jezioro) near Wilno. This shows, that the limit of its distribution is farther north than accepted. The occurrence of the nymph period in the Wilno district and the preceding observations of Dziędzielewicz, Zaćwiliński, Sumiński, Poliński, Prüffer and Fudakowski concerning Middle and South Poland disagree with the supposition of Scholz that *Anax imperator* L. as formed in Poland represents the migrating form only.

Z Zakładu Zoologii Uniwersytetu S. B. w Wilnie.

## WYKAZ CHRZĄSZCZÓW OKOLIC PRZEMYŚLA

[VERZEICHNIS DER KÄFER DER UMGEBUNG VON PRZEMYŚL]

### HETEROMERA

PODAL

T. TRELLA.

### OEDEMERIDAE.

*Anoncodes rufiventris* Scop. VI, VII. Prałkowce, Turnica.

*A. fulvicollis* Scop. VII. Turnica.

‡ *f. v. media* Gredl. z poprzednią.

*A. adusta* Pnz. VI, VII. na przedmieściach.

*Ischnomera sanguinicollis* Fbr. 2 p. V, VI. Brylińce, Turnica.

*I. coerulea* Lin. IV, V, 1 p. VI. Kruhel Wk., Prałkowce, Brylińce, Turnica.

*Chrysanthia viridis* Schmidt. 2 p. VI, VII. Prałkowce, Brylińce, Turnica, Dubiecko.

‡ *v. a. geniculata* Heyd. VII. Turnica.

‡ dla fauny Polski nowe.

+ podane z kresów jak Śląsk, Prusy, Litwa etc. w Wykazie M. Łomnickiego. Lwów. Kosmos. 1913.

- Oedemera flavipes* Fbr. 2 p. VI, 1 p. VII. Brylińce, Kopyśno.  
*O. podagrariae* L. VI. Winna Góra.  
*O. flavescens* L. posp.  
*O. virescens* L. posp.  
*O. lurida* Marsh. posp.

## PYTHIDAE.

- Pytho depressus* L. 2 p. V. Dubiecko.  
*Sphaeriestes castaneus* Pnz. III, IV, X, XI. Budy Mł. i Wk.  
 Brylińce.  
*S. foveolatus* Ljung. IV, V, VI. Prałkowce, Brylińce.  
*Rhinosimus viridipennis* Latr. V, VI. Prałkowce, Brylińce.  
*Rh. ruficollis* Lin. posp.  
*Rh. planirostris* Fbr. posp.  
*Mycterus curculionoides* Fbr. VI. Łętownia.

## PYROCHROIDAE.

- Pyrochroa coccinea* L. posp.  
*P. serraticornis* Scop. V, VI. na przedmieściach, Prałkowce.  
*P. pectinicornis* L. V, VI, 1 p. VII. Budy Mł. i Wk., Prałkowce,  
 Kruhel. Wk., Łętownia, Brylińce.

## HYLOPHILIDAE.

- Hylophilus populneus* Pnz. IV, V, VI. przedmieścia, Prałkowce, Brylińce, Hurko.  
*H. pygmaeus* Deg. VII. Budy Wk.

## ANTHICIDAE.

- Notoxus monoceros* L. V, VI, VII. nad Sanem, Starzawa, Lacka Wola.  
 ‡ *m. a. unicornis* Westh. z poprzednim.  
 ‡ *m. a. latemaculatus* Pic. z poprz.  
*N. brachycerus* Fald. V. Prałkowce.  
*N. cornutus* Fbr. VIII. Prałkowce, Nowosiółki Dyd.  
*Anthicus floralis* L. VI, VII, VIII, IX. przedmieścia, Prałkowce,  
 Pikulice.  
*A. hispidus* Rossi VII. Prałkowce.  
*A. antherinus* L. VII, VIII, IX. Prałkowce, Ostrów, Budy Mł.  
*A. flavipes* Pnz. VII. Prałkowce, Łętownia.

## MELOIDAE.

*Meloë proscarabaeus* L. IV, V. posp.

*M. violaceus* Mrsh. IV, V. posp.

*M. decorus* Brandt. 1 p. V. brzegi Sanu, Buszkowice.

*M. cicatricosus* Leach. IV, V. Zamek przem., Kruhel Mł., Budy Mł., Łętownia.

*M. variegatus* Donovan. IV, V. Zamek przem., Żurawica, Łętownia.

*M. brevicollis* Pnz. IV, V. Zamek przem., Kruhel Mł., Budy Mł., Łętownia.

*M. rugosus* Mrsh. IX, X. Kruhel Mł., Budy Mł.

*Lytta vesicatoria* L. VI. Zamek przem., przedmieścia.

## RHIPIPHORIDAE.

*Pelecotoma fennica* Payk. 1 p. VII. Prałkowce, Żurawica. (Wierzby, w otworach *Ptilinus fuscus* Geoffr.).

+ *Metococus paradoxus* L. ♀ 22. VIII. Cisowa (w Wykazie: Bor., Liv., Sil.).

+ p. a. *apicalis* Gredl. ♂ (w Wyk.: Sil.).

‡ p. a. *nigrioventris* Gredl. ♂.

## MORDELLIDAE.

*Scaptia fuscula* Müll. 1 p. VII. Brylińce (wysiana w dębie).

*Tomoxia biguttata* Gyll. VI, VII, VIII. Prałkowce, Brylińce, Turnica.

*Mordella perlata* Sulz. a. *6-punctata* Hrbst. VI. Prałkowce, Turnica.

*M. maculosa* Naezen. VI, VII. Prałkowce.

*M. bisignata* Redt. VI, VII. Prałkowce, Zalesie, Brylińce, Turnica.

*M. aurofasciata* Com. VI, VII. Budy Mł., Turnica.

*M. fasciata* Fbr. posp.

‡ f. a. *interrupta* Costa z poprz.

‡ f. a. *basalis* Costa z poprz.

‡ f. a. *coronata* Costa z poprz.

*M. aculeata* L. posp.

*M. a. a. femoralis* Baud. VI. Prałkowce.

*M. a. a. leucaspis* Küst. posp.

*Mordellistena abdominalis* Fbr. VI, VII. Pikulice, Prałkowce, Brylińce, Krzeczkowa, Turnica.

‡ *a. a. fulvohirta* Schilsk. z poprz.

‡ *a. a. maculicollis* Schilsk. z poprz.

*M. humeralis* L. VI, VII. Pikulice, Starzawa.

+ *h. a. axillaris* Gyll. VII. Starzawa, (w Wyk. Sil.).

‡ *h. a. nigricollis* Schilsk. VII. z poprz.

‡ *h. a. fulvipennis* Schilsk. VII. Prałkowce, Pikulice, Brylińce.

‡ *h. a. atrata* Schilsk. VII. Starzawa.

*M. lateralis* Oliv. VI, VII. Prałkowce, Brylińce.

+ *l. a. atricollis* Schilsk. VII. Brylińce (w Wyk. Sil.).

*M. neuwaldeggiana* Pnz. VI, VII. posp.

*M. parvula* Gyll. VI, VII. Prałkowce, Brylińce.

+ *p. a. picipes* Costa. 2 p. VI. Brylińce, (w Wyk. Lith.).

*M. brevicauda* Boh. VI, VII. Prałkowce, Brylińce.

*M. micans* Germ. VI, VII. posp.

*M. pumila* Gyll. VI, VII. posp.

*Cyrtanaspis phalerata* Grm. VI, VII. Turnica.

*Anaspis 4-maculata* Gyll. a. *4-pustulata* Müll. 1 p. VII. Turnica, (na liściach olchy białej).

*A. brunnipes* Muls. posp.

*A. rufilabris* Gyll. posp.

*A. frontalis* L. posp.

*A. f. a. lateralis* Fbr. posp.

+ *f. a. punctata* Eschsch. VI. Prałkowce (w Wyk. Bor.).

*A. thoracica* L. V, VI, VII. Budy Mr. i Wk., Prałkowce, Brylińce.

+ *th. a. fuscescens* Steph. VI. Prałkowce, Pikulice, Brylińce, (w Wyk. Lith.).

‡ *th. a. signata* nov. VI. Pikulice. †)

#### MELANDRYIDAE.

+ *Tetratoma fungorum* Fbr. III, IV, X, XI. Prałkowce, Mazury, Brylińce (Czyrak) (na grzybach *Clavaria* sp.).

*T. ancora* Fbr. IV, V, VI, VII, VIII, IX. Prałkowce, Krasieczyn, Pikulice, Brylińce, Turnica.

*Eustrophus dermestoides* Fbr. VII, przedmieścia, Prałkowce, Pikulice, Żurawica, Łętownia, Makowa, Turnica.

†) *Anaspis thoracica* L. a. *signata* nov. posiada tarczę szyjową opatrzoną ciemną plamką, zresztą jak typowa.

*Hallomenus binotatus* Quens. 2 p. VI, VII, VIII, IX. Budy Mł., Brylińce, Turnica.

*H. axillaris* Ill. VII. Turnica.

*Orchesia micans* Pnz. VI, VII, VIII, IX. Budy Mł. i Wk., Prałkowce, Krasiczyn, Brylińce.

*O. minor* Walk. VI, VII, VIII. Prałkowce, Brylińce.

*O. undulata* Kr. 2 p. VI, VII, VIII. Prałkowce, Brylińce.

*O. fasciata* Payk. V, VI. Budy Wk., Prałkowce, Brylińce.

*O. blandula* Brancsik, zwł. VIII, IX, X. Budy Mł. i Wk. Prałkowce, Pikulice, Kruhel Wk., Brylińce.

*Abdera affinis* Payk. V, VI. Prałkowce, Brylińce.

*A. flexuosa* Payk. V, VI. Prałkowce.

+ *A. triguttata* Gyll. v. *scutellaris* Muls. 1 p. VI. Turnica, (w Wyk. Sil.).

+ *Phloeotrya rufipes* Gyll. VI. Budy Wk. (na dębach wypróchniałych). (W Wyk. Carp. or.).

‡ *r. a. testaceipennis* Pic. z poprz.

*Xylita buprestoides* Payk. 2 p. IV, V, VI. Budy Wk., Brylińce (sosny, jodły).

+ *X. livida* Sahlb. VI, VII. Brylińce, Turnica (pod korą i na sągach jodłowych, w Wyk. Carp.).

*Serropalpus barbatus* Schall. 2 p. VI, VII, VIII. Cisowa, Brylińce, Turnica.

*Hypulus quercinus* Quens. IV, V, VI. Pikulice, Kruhel Wk., Brylińce.

*H. bifasciatus* Fbr. II, V, VI. Budy Mł. i Wk. Prałkowce (II. w wypróchniałej olsze czarnej).

+ *Zilora sericea* St. VI, VII. Brylińce, Turnica (pod korą i na sągach jodłowych), (w Wyk. Sil. Bor.).

*Melandrya dubia* Schall. 2 p. V, VI. 1 p. VII. Budy Wk., Prałkowce, Kruhel Wk., Brylińce, Turnica.

‡ *d. a. brunnea* nov. 2 p. VI. Brylińce (pod korą jodły).<sup>1)</sup>

*M. caraboides* L. V, VI, 1 p. VII. posp.

*M. barbata* Fbr. 2 p. V. Turnica, (jeden okaz w *Hydnum* na buku).<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> *Melandrya dubia* Schall. a. *brunnea* nov. ubarwienie rdzawo-żółte, głowa, tarcza szyjowa i uda ciemniejsze.

<sup>2)</sup> O ile „Wykaz” oparty jest na podstawie okazu w „Muzeum” (*Mel. dubia* Schall.) jest formą nową dla fauny Polski.

*Phryganophilus auritus* Motsch. 2 p. V, 1 p., VI. Budy Wk., Prałkowce (na grabach i bukach).

+ *Conopalpus testaceus* Ol. v. *flavicollis* Gyll. 1 p. VI. Brylińce (w wypróchniałym dębie) (w Wyk. Bor.).

*Ospya bipunctata* Fbr. VI. Prałkowce (na buku).

#### LAGRIIDAE.

*Lagria hirta* L. VI, VII, VIII, IX. posp.

#### ALLECULIDAE.

*Allecula morio* Fbr. 2 p. VI, VII. Prałkowce, Brylińce, Ba-kończyce.

‡ *A. rhenana* Bach. 1 p. VII. przedmieście Popielówka, (w wypróchniałej lipie).

*Prionychus ater* Fbr. VII, przedmieścia, Prałkowce, Żurawica.

*Hymenalia rufipes* Fbr. VII, przedmieście Popielówka.

*Gonodera ceramboides* L. v. *serrata* Chevr. VI, VII. Budy Wk., Pikulice, Kruhel Wk., Brylińce, Turnica.

*G. luperus* Hrbst. VI, 1 p. VII. Lacka Wola, Trzcieniec.

*G. murina* L. 2 p. V, VI, przedm. Popielówka, Pikulice, Żurawica, Herburt.

*G. m. a. evonymi* Fbr. z poprz.

*G. m. a. thoracica* Fbr. z poprz.

*Podonta nigrita* Fbr. 1 p. VII. Starzawa.

*Omophlus rufitarsis* Leske. 2 p. VI, VII. Byków, Lacka Wola.

#### TENEBRIONIDAE.

*Blaps mortisaga* L. posp.

*B. lethifera* Mrsh. VI. (1 okaz).

*Platyscelis polita* Strm. VI. Nienowice (nad Wiśnią).

*Melanimon tibiale* Fbr. V, VI. Starzawa, Lacka Wola.

*Opatrum sabulosum* L. posp.

*Crypticus quisquilius* L. 2 p. VI, VII. przedmieścia pñ., Starzawa, Lacka Wola, Buców.

*Boletophagus reticulatus* L. III - X. Prałkowce, Kruhel Wk., Brylińce, Mazury, Turnica.

+ *B. interruptus* Ill. I—XII. Brylińce, Turnica (w *Polyporus* sp. na jodłach i *Hydnum* sp. na bukach), (w Wyk. Tatr. m.).

- Eledona agaricola* Hrbst. I—XII. posp.  
*Scaphidema metallicum* Fbr. I—XII. posp.  
*S. m. a. bicolor* Fbr. z poprz.  
*Diaperis boleti* L. V—IX. Brylińce, Turnica.  
 † *b. a. fungi* Motsch. z poprz.  
*Platydema violaceum* Fbr. III—VIII. Budy Wk., Brylińce,  
 (kopulacja V).  
*P. dejeuni* Lap. V—IX. Pikulice, Kruhel Wk., Brylińce,  
 Turnica.  
*Arrhenoplita haemorrhoidalis* Fbr. IV—VIII. Turnica (w *Polyporus* na bukach).  
*Pentaphyllus testaceus* Hellw. IV, V. Pikulice (w wypróchnia-  
 łych dębach z gniazdami os i szerszeni).  
*Hypophloeus unicolor* Pill. III—X. Budy Wk., Prałkowce, Kruhel  
 Wk., Pikulice, Brylińce, Turnica.  
 † *u. a. abietis* nov. VI (pod korą jodły).<sup>1)</sup>  
*H. fraxini* Kug. IV. Brylińce.  
*H. pini* Pnz. IX. Budy Mł.  
*H. bicolor* Ol. VI. Turnica (w buku).  
*Tribolium navale* Fbr. VIII. przedm. Popielówka (w rozbitym  
 pniu pszczelnym).  
*T. madens* Charp. z poprz.  
*T. confusum* Duv. II, V. w mieście, (w piekarni, b. liczny).  
*Melasia culinaris* L. I—XII. Brylińce, Turnica (w jodłach  
 i bukach).  
*M. perroudi* Muls. z poprzednią.  
*Tenebrio obscurus* Fbr. VII. Brylińce (1 okaz pod korą jodły).  
*T. molitor* L. VI, IX. posp.  
 † *T. m. a. flavus* nov. VII. przedm. Popielówka (1 okaz).<sup>2)</sup>  
 + *Boros schneideri* Pnz. 2 p. VI, 1 p. VII. Turnica (2 okazy,  
 w jodle, w otworach po *Eurythyrea austriaca* L.) (w Wyk. Lith.,  
 Carp. or., Tatr. m.).  
 + *Laena reitteri* Wse. III—XI. Budy Mł. i Wk., Pikulice, Kruhel  
 Wk., Mazury (pod butwiejącymi liśćmi dębowymi i bukowymi),  
 (w Wyk. Hal. occ.).

<sup>1)</sup> *Hypophloeus unicolor* Pill. a. *abietis* nov.  $\frac{2}{3}$  skrzydeł od nasady rdza-  
 wo-żółte, zresztą ciemno-brunatny.

<sup>2)</sup> *Tenebrio molitor* L. a. *flavus* nov. brudno-żółty, rożki i nogi ciemne.

‡ *reitt. a. subcarpathica* nov. z poprzednią.<sup>1)</sup>

*Helops lanipes* L. pospolity.

*H. quisquilius* St. Vl. Dubiecko.

### RÉSUMÉ.

Es werden unter den in der Umgebung von Przemyśl vorgefundenen Heteromeren 5 neue Aberrationen unterschieden:

1. *Anaspis thoracica* L. a. *signata* nov. Hahschild in der Mitte mit einer schwärzlichen Makel, sonst wie Stammform.

2. *Melandrya dubia* Schall. a. *brunnea* nov. rostgelb, Kopf, Halsschild und Schenkel schwärzlich.

3. *Hypophloeus unicolor* Pill. a. *abietis* nov.  $\frac{2}{3}$  der Fliegeldecken rostgelb, sonst schwarzbraun.

4. *Tenebrio molitor* L. a. *flavus* nov. gelbbraun, Fühler und Beine schwärzlich.

5. *Laena reitteri* Wse. a. *subcarpathica* nov. rostgelb, Kopf dunkler, Fühler und Beine rotbraun; (Stammform: Körper schwärzlich bis schwarz, Fühlerbasis und Beine rotbraun).

## TRZY GATUNKI DLA FAUNY POLSKI NOWYCH CHRZĄSZCZY

[DREI FÜR POLENFAUNA NEUE KÄFER]

PODAJ.

T. TRELLA.

*Staphylinus* L. *chloropterus* Pnz., dwa okazy wysiane z pod suchych liści w lesie pikulickim, IV, X.

*Selatosomus* Steph. *depressus* Grm., jeden okaz w lipie wypróchniałej na przedmieściu Popielówka, 1 p. VII.

*Enoplium* Latr. *serraticorne* Oliv., dwa okazy na zsychnającym dębie w lasku Budy Mł., 2 p. VI, 26. VII. 22.

<sup>1)</sup> *Laena reitteri* Wse. a. *subcarpathica* nov. żółto-brązowa, głowa ciemniejsza, rożki i nogi czerwonawe; za typowe uważam ubarwienie ciemno-brunatne, do czarnego, nasada rożków i nogi czerwono-brunatne.